



FICHA TECNICA

TRATAMIENTO COMPLETO FRUTALES Y ARBOLES CADUCOS

30618



INTRODUCCIÓN

El **TRATAMIENTO COMPLETO FRUTALES Y ARBOLES CADUCOS** de FLOWER, es una mezcla fitosanitaria (fungicida + aceite mineral + insecticida) que actúa por contacto, ingestión y asfixia contra cochinillas en cualquier estado, adulta o larva.

Elimina todo tipo de insectos, ácaros y hongos en cualquier estado: adulto, larva, huevo.



COMPOSICIÓN

Aceite de parafina, 79% p/v (INSECTICIDA)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº 12.434

Fosmet, 50% p/v (INSECTICIDA)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº 12.352

Oxicloruro de cobre, 50% p/v (FUNGICIDA)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº 15.314

PRESENTACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

Polvo mojable (WP)
Polvo mojable (WP)

Se presenta en:

Caja con:
Botella de 250ml.
Sobre de 35g.
Sobre de 50g.
Dosificador.

PRINCIPALES APLICACIONES

*** AUTORIZADO PARA JARDINERIA EXTERIOR DOMESTICA ***

El **KIT TRATAMIENTO COMPLETO FRUTALES** de flower, es una mezcla fitosanitaria (fungicida + aceite mineral + insecticida) que actúa por asfixia, contacto, ingestión e inhalación contra numerosos insectos, ácaros y hongos en cualquier estado: adulto, larva, huevo.

Su aplicación conjunta permite una acción curativa y preventiva puesto que por una parte el insecticida y el fungicida actúan en el momento de su aplicación mientras que el aceite deja una lámina protectora de alta persistencia sobre el vegetal que asegura una acción insecticida prolongada.

Especialmente indicado para tratamientos tanto preventivos como curativos a la caída de las hojas, en la poda y en el hinchado de las yemas protegiendo a los árboles frutales y de hoja caduca durante todo el invierno.



Árbol frutal (Manzano)



Árbol de hoja caduca (Liquidámbar)

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

APLICACIONES AUTORIZADAS. MODO DE EMPLEO Y DOSIS.

- Mezclar 10 ml de ACEITE MINERAL + 1,5 gr de FOSMET + 3 gramos de FUNGICIDA OXICLORURO DE COBRE 50% por litro de agua.

Aplicar en pulverización foliar normal con mochila, garantizando una buena cobertura de la pulverización, pulverizando bien todas las partes de la planta.

Recomendaciones de uso:

- Efectuar la mezcla en el momento de la aplicación.
- Calcular previamente la cantidad a consumir de caldo de tratamiento pues no es recomendable guardar la mezcla una vez ya hecha en el pulverizador o en la mochila de aplicación.
- Pulverizar abundantemente de modo que el caldo cubra por entero todas las partes del árbol.

Precauciones:

- Los tratamientos en cítricos se deberán dar antes del cambio de color de los frutos.
- No aplicar el producto hasta pasados 40 días después de haber dado un tratamiento con azufre, ni cuando se prevean heladas ni en días calurosos y secos.
- Se deberán observar precauciones por la fitotoxicidad del producto para plantas herbáceas y para los frutales, especialmente los de hueso.

Plazo de seguridad: deben transcurrir **30 días** entre la aplicación y la recolección de los frutos.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.